GIRONA NOTICIES.COM
+ Periodisme

Cómo se tratan los hipospadias, con el Dr. Daniel Cabezalí

Actualidad Empresarial | 13/06/2023 | 00:00

Los hipospadias son una condición congénita en la cual la abertura del conducto urinario se encuentra en una posición anormal en la parte inferior del pene en lugar de estar en la punta. Para tratar esta afección, los médicos urólogos utilizan una cirugía llamada reparación de hipospadias. El Dr. Daniel Cabezalí es un urólogo pediátrico en Madrid que se caracteriza por su amplia experiencia tratando este tipo de afecciones en niños pequeños, mejorando así su calidad de vida y consiguiendo la apariencia normal y esperada de sus genitales.

El tratamiento de los hipospadias es la cirugía a edad temprana

La edad adecuada para tratar los hipospadias puede variar según la gravedad de la condición y la recomendación del médico urólogo. En general, se suele realizar la cirugía de reparación de hipospadias durante la infancia, preferiblemente entre los 6 y 18 meses de edad.

La cirugía en esta etapa temprana tiene varias ventajas. Entre ellas, permite corregir la posición de la abertura uretral antes de que el niño comience a desarrollar una conciencia de su anatomía genital. También se considera que la cirugía temprana ayuda a prevenir posibles problemas psicológicos o emocionales asociados con la condición.

Durante la cirugía, el médico urólogo realiza una serie de pasos para corregir la posición de la abertura del conducto urinario. Primero, se crea una nueva abertura en la punta del pene y se reconstruyen los tejidos para que el pene tenga una forma más natural.

En algunos casos, puede ser necesario utilizar tejido de otras partes del cuerpo, como el prepucio o la piel del escroto, para realizar la reconstrucción. Esto ayuda a crear una abertura uretral más adecuada y a mejorar la apariencia del pene.

Sin embargo, en algunos casos más leves de hipospadias, los médicos pueden optar por esperar hasta que el niño sea un poco mayor, generalmente alrededor de los 18-24 meses, antes de realizar la cirugía. Esto se debe a que los tejidos pueden seguir madurando y hacer más fácil la reparación.

Un urólogo pediátrico en Madrid puede ayudar a resolver dudas sobre esta afección

Es importante tener en cuenta que cada caso de hipospadias es único, por lo que el tratamiento puede variar según la gravedad y la ubicación específica del trastorno. El médico urólogo evaluará cada situación individualmente y recomendará el enfoque más adecuado.

La reparación de hipospadias es una cirugía segura y efectiva que permite corregir esta condición y mejorar la función y apariencia del pene. Es importante consultar a un médico urólogo especializado en el tratamiento de los hipospadias para obtener un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento adecuado a cada caso específico.

Si hay alguna preocupación sobre el hipospadias en un hijo, es fundamental consultar a un médico urólogo especializado en el tratamiento de esta condición. El médico podrá realizar una evaluación completa y brindar recomendaciones específicas para cada caso. El Dr. Daniel Cabezalí es experto en esta materia y resolverá todas las dudas con respecto a la cirugía y su recuperación.

Autor: Redacció

https://gironanoticies.com/empresarial/208416-como-se-tratan-los-hipospadias-con-el-dr-daniel-cabezali.htm