

Disminueix la proliferació del mosquit tigre.

Catalunya | 21-07-2011 | 12:31



Un estudi experimental realitzat a Sant Cugat del Vallès i a Rubí (Barcelona) coordinat per científics de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha demostrat per primera vegada que la proliferació del mosquit tigre disminueix combinant tres mesures d'eradicació.

Segons un comunicat, la combinació de les tres mesures complementàries --evitar aigua estancada, usar insecticides per eliminar larves i adults, i netejar els terrenys d'escombraries-- redueix la seva presència a la meitat, segons avala la investigació, que ha consistit en el recompte d'ous en petites trampes experimentals.

Les estratègies han inclòs un programa de visites d'un equip d'informadors als habitatges de les àrees afectades, per explicar mesures de prevenció i evitar que s'acumulés aigua estancada en els recipients domèstics dels jardins i patis, així com el tractament amb insecticides als dipòsits d'aigua i clavegueres --per eliminar les larves-- i a la vegetació de parcs i jardins --per eliminar els insectes adults--.

La tercera estratègia consisteix en la neteja de les escombraries incontrolades als terrenys que poguessin afavorir la proliferació dels mosquits.

En el programa de visites, els investigadors han inspeccionat més de 3.000 cases i s'han entrevistat amb gairebé 700 persones, abans de publicar un estudi a 'Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene', que demostra per primera vegada a Europa que els ous trobats han estat significativament inferiors a les àrees d'intervenció.

Fuente: Europa Press

Autor: Europa Press